




*Kotwica dla
herbicydu*



Najczęstsze problemy przy stosowaniu herbicydów doglebowych.

- Problem z równomiernym pokryciem zbrylonej ziemi
- Fotodegradacja zalegającej substancji na powierzchni ziemi
- Wywiewanie z cząstkami gleby
- **Wymywanie** przez deszcz w głąb profilu glebowego, co skutkuje fititoksycznością.



Kiedy stosować i dlaczego

- Zawsze kiedy oczekujemy, aby stosowany środek pozostał nienaruszony we wierzchniej warstwie gleby.
- Na niedostatecznie uprawionych stanowiskach.
- W wypadku zagrożenia wymywaniem lub wywiewaniem.
- Zawsze we wszystkich uprawach rolniczych, warzywniczych i sadowniczych z herbicydami o działaniu doglebowym.

Zabieg z AquaFol ANCHOR powoduje:

- Zwiększa wiązanie się substancji aktywnych z cząstkami gleby, przez co poprawia skuteczność zwalczania chwastów także w warunkach okresowej suszy oraz wydłuża działanie herbicydów.
- Równomierne i dokładne pokrycie traktowanej powierzchni.
- Polepszenie skuteczności agrochemikaliów stosowanych na lekko zbryloną glebę.
- Szybkie przenikanie stosowanych agrochemikaliów na niewielką głębokość zapobiegające ulatnianiu się substancji aktywnych do atmosfery, ich fotodegradacji oraz wypłukiwaniu przez deszcz w głębsze warstwy.